

Primär biliäre
Cholangitis (PBC)

Ihre Therapie mit
Lyvdelzi[®]
(Wirkstoff: Seladelpar 10 mg)

**Fragen und Antworten sowie wichtige
Informationen zu Ihrem Medikament**



GILEAD

Creating Possible

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihre Ärztin/Ihr Arzt hat Ihnen Lyvdelzi® zur Behandlung Ihrer primär biliären Cholangitis (PBC) verschrieben. Dies kann entweder anstelle Ihres bisherigen Medikaments oder zusätzlich dazu sein.

Damit Sie bestens über Ihre Behandlung informiert sind und die wichtigsten Fakten immer griffbereit haben, hat Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt diese Broschüre überreicht.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, warum diese Therapie notwendig ist und wie sie Ihnen helfen kann.

Ihr Lyvdelzi®-Team

Diese Broschüre richtet sich an Erwachsene.



Was ist Lyvdelzi® und wie wirkt es?

Lyvdelzi® ist ein Medikament
zur **Behandlung der primär
biliären Cholangitis (PBC)**
bei Erwachsenen.



Wie muss Lyvdelzi® aufbewahrt werden?

Lagern Sie Lyvdelzi® nicht über 30 °C. Bewahren Sie
dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.



Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Lyvdelzi® Neben-
wirkungen haben, die nicht bei jeder/jedem auftreten
müssen.

Häufige Nebenwirkungen sind:

- **Sehr häufig** (mehr als 1 von 10 Behandelten):
Bauchschmerzen
- **Häufig** (bis zu 1 von 10 Behandelten):
Kopfschmerzen, Übelkeit, aufgeblähter Bauch

Sollten Sie diese oder andere Nebenwirkungen be-
merken, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt
oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Beenden Sie die
Einnahme des Arzneimittels nicht ohne Rücksprache.



Wie ist Lyvdelzi® einzunehmen?

Nehmen Sie **1x täglich 1 Kapsel Lyvdelzi®** mit oder ohne Nahrung ein. Schlucken Sie die Kapsel im Ganzen mit Wasser.

Lyvdelzi® kann zusammen mit Ursodeoxycholsäure (UDCA) eingesetzt werden oder als alleinige Therapie bei Patient:innen, die UDCA nicht anwenden können.

Wenn Sie zu viele Hartkapseln eingenommen haben

Wenn Sie mehr Lyvdelzi®-Kapseln eingenommen haben, als Sie sollten, informieren Sie sofort Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder geben Sie in Ihrer Apotheke Bescheid. Symptome einer Überdosierung können u. a. dunkler Urin oder Muskelschmerzen sein.

Einnahme von Lyvdelzi® zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder geben Sie in Ihrer Apotheke Bescheid, wenn Sie andere Arzneimittel oder pflanzliche Heilmittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen einzunehmen. Besonders wichtig ist dies bei folgenden Arzneimitteln:

- Probenecid (bei Gicht)
- Ciclosporin (bei Organtransplantationen)
- Gallensäurebindende Harze (zur Cholesterinsenkung)
- Fluconazol (bei Pilzinfektionen)
- Mifepriston (bei medikamentösem Schwangerschaftsabbruch)

Wenn Sie die Einnahme vergessen haben

Wenn Sie die Einnahme von Lyvdelzi® vergessen haben, lassen Sie die vergessene Dosis aus und nehmen Sie die nächste Dosis zum nächsten geplanten Zeitpunkt ein. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

Was bei Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten ist

Wenn Sie schwanger sind, stillen, eine Schwangerschaft vermuten oder planen, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Wichtige Informationen für Patientinnen und Patienten

Diese Broschüre ersetzt nicht die Packungsbeilage, enthält jedoch wichtige Hinweise daraus. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von Lyvdelzi® beginnen.

Falls Sie Fragen zur Einnahme von Lyvdelzi® haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Sie sind für Sie da und unterstützen Sie gerne.

Ihre Therapie im Überblick

(Von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt auszufüllen)

Ihre Diagnose

Praxisstempel

Weitere Kommentare



Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind.

Nebenwirkungen können gemeldet werden über:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn

Website:

www.bfarm.de

Arzneimittel – Pharmakovigilanz – Risiken melden

Oder für Gilead Produkte über folgende Website:

www.gilead.com/utility/contact/report-an-adverse-event

Durch das Melden von Nebenwirkungen tragen Sie dazu bei, mehr Informationen über die Sicherheit von Lyvdelzi® bereitzustellen.



Mehr zum Leben und Umgang mit primär biliärer Cholangitis (PBC) erfahren Sie oder Ihre Angehörigen auch auf der Website für Patient:innen.

www.meine-leber-und-ich.de



GILEAD

Creating Possible

Herausgeber

Gilead Sciences GmbH | Fraunhoferstraße 17
82152 Martinsried b. München